

PRECONISATIONS PATIENT

Recherche de l'Infection à l'*Helicobacter pylori*

▪ Matériel de prélèvement

Kit de prélèvement : à acheter en pharmacie.

- Marque *HELIKIT*[®] : Kit complet
- Marque *Helicobacter Test INFAI*[®] : Kit complet

Conserver la boîte à température ambiante à l'abri de la chaleur.

Venir avec le kit au laboratoire le jour du prélèvement.

▪ Préconisation avant le prélèvement

- Être à jeun : ne pas manger, boire et fumer 12h avant le prélèvement
- Être au repos
- Examen devant être réalisé en dehors des traitements médicamenteux (amener votre ordonnance) :
 - 4 semaines après arrêt des antibiotiques
 - 2 semaines après arrêt d'un traitement par inhibiteur de la pompe à protons (*ex : Oméprazole / Mopral, Inexium, Ogast,...*)
 - 24 heures après arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux (*Gaviscon, Smecta, Duspatalin...*)
- Examen contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement.

▪ Déroulement du test

Le prélèvement se réalise au laboratoire

- Si des médicaments ont été pris dans les deux semaines précédant le jour du prélèvement, indiquez-le au préleveur.
- Le test consiste à réaliser 2 prélèvements d'air expiré (pas de prise de sang) après absorption d'une solution buvable médicamenteuse préparée au laboratoire. Prévoyez une demi-heure, au repos, entre les 2 prélèvements.
- Vous serez assisté du préleveur pour réaliser les prélèvements.

▪ Effets indésirables éventuels

En cas d'effets indésirables constatés suite à l'absorption de la solution buvable, prévenez le biologiste du laboratoire, votre pharmacien ou votre médecin.

PRECONISATIONS PATIENT

Recherche de l'Infection à l'*Helicobacter pylori*

▪ Matériel de prélèvement

Kit de prélèvement : à acheter en pharmacie.

- Marque *HELIKIT*[®] : Kit complet
- Marque *Helicobacter Test INFAI*[®] : Kit complet

Conserver la boîte à température ambiante à l'abri de la chaleur.

Venir avec le kit au laboratoire le jour du prélèvement.

▪ Préconisation avant le prélèvement

- Être à jeun : ne pas manger, boire et fumer 12h avant le prélèvement
- Être au repos
- Examen devant être réalisé en dehors des traitements médicamenteux (amener votre ordonnance) :
 - 4 semaines après arrêt des antibiotiques
 - 2 semaines après arrêt d'un traitement par inhibiteur de la pompe à protons (*ex : Oméprazole / Mopral, Inexium, Ogast,...*)
 - 24 heures après arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux (*Gaviscon, Smecta, Duspatalin...*)
- Examen contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement.

▪ Déroulement du test

Le prélèvement se réalise au laboratoire

- Si des médicaments ont été pris dans les deux semaines précédant le jour du prélèvement, indiquez-le au préleveur.
- Le test consiste à réaliser 2 prélèvements d'air expiré (pas de prise de sang) après absorption d'une solution buvable médicamenteuse préparée au laboratoire. Prévoyez une demi-heure, au repos, entre les 2 prélèvements.
- Vous serez assisté du préleveur pour réaliser les prélèvements.

▪ Effets indésirables éventuels

En cas d'effets indésirables constatés suite à l'absorption de la solution buvable, prévenez le biologiste du laboratoire, votre pharmacien ou votre médecin.

PRECONISATIONS PATIENT

Recherche de l'Infection à l'*Helicobacter pylori*

▪ Matériel de prélèvement

Kit de prélèvement : à acheter en pharmacie.

- Marque *HELIKIT*[®] : Kit complet
- Marque *Helicobacter Test INFAI*[®] : Kit complet

Conserver la boîte à température ambiante à l'abri de la chaleur.

Venir avec le kit au laboratoire le jour du prélèvement.

▪ Préconisation avant le prélèvement

- Être à jeun : ne pas manger, boire et fumer 12h avant le prélèvement
- Être au repos
- Examen devant être réalisé en dehors des traitements médicamenteux (amener votre ordonnance) :
 - 4 semaines après arrêt des antibiotiques
 - 2 semaines après arrêt d'un traitement par inhibiteur de la pompe à protons (*Oméprazole / Mopral, Inexium, Ogast,...*)
 - 24 heures après arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux (*Gaviscon, Smecta, Duspatalin...*)
- Examen contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement.

▪ Déroulement du test

Le prélèvement se réalise au laboratoire

- Si des médicaments ont été pris dans les deux semaines précédant le jour du prélèvement, indiquez-le au préleveur.
- Le test consiste à réaliser 2 prélèvements d'air expiré (pas de prise de sang) après absorption d'une solution buvable médicamenteuse préparée au laboratoire. Prévoyez une demi-heure, au repos, entre les 2 prélèvements.
- Vous serez assisté du préleveur pour réaliser les prélèvements.

▪ Effets indésirables éventuels

En cas d'effets indésirables constatés suite à l'absorption de la solution buvable, prévenez le biologiste du laboratoire, votre pharmacien ou votre médecin.